

СКЛАДНІ РІДКІ ДОБРИВА та БІО СТИМУЛЯТОРИ




ТОВ «АГРО-ПЕСТИЦИД»

1

ТОВ «ПЕСТИЦИД»

Одна з перших компаній в Болгарії, яка була створена для комплексу обслуговування та задоволення потреб фермерів




Регіональні агрономи ТОВ «Пестицид», що охоплюють територію всієї країни, пропонують оптимальне поєднання продуктів, налаштованих на кожного виробника в залежності від можливостей господарства і цілей виробництва



Власна селекція високоякісних і високоврожайних сортів пшениці затребувана не лише в Болгарії, а й у сусідніх країнах.




ТОВ «Пестицид» має висококваліфікованих фахівців в області захисту рослин, селекції та насінництва, а також науково-дослідної діяльності




Постійно зростає число клієнтів ТОВ «Пестицид» шукає консультаційні послуги та продукти, пропоновані компанією

Компанія ТОВ «Пестицид» завоювала довіру найавторитетніших компаній галузі.



Будь-який продукт
захисту рослин, сорт,
гібрид або добриво і т. д.
до того, як він потрапить до
клієнтів, попередньо перевіряється
на експериментальних полях
компанії



ТОВ «Пестицид» здійснює
широкомасштабне виробництво
насіння у власній і одній з найбільших
високотехнологічних і сучасно
обладнаних баз для очищення і
заготівлі насіння в Болгарії



висококваліфіковані
спеціалісти



власна селекція
високоврожайні сорти пшениці



препарати для
захисту рослин



якісне та
ефективне насіння



добриво



30 РОКІВ
Офіційний представник
на українському ринку
ТОВ «АГРО-ПЕСТИЦИД» **2 РОКИ**

Компанія ТОВ «Пестицид», заснована на
інноваційних технологіях, успішно налагодила
виробництво запатентованих біостимуляторів
Extra Force, які вже широко використовуються.

Широкий асортимент продуктів під маркою
Extra Force призначений для різних культур на
всіх етапах їхнього розвитку та відповідає
викликам кліматичних умов. Окрім поживної дії,
ці біостимулятори мають також антистресовий
і зміцнювальний ефект.







Сучасна
високотехнологічна
виробнича лінія, яка сама
по собі є природним
тунелем для проникнення
всіх необхідних поживних
елементів в рослини, без
яких людство не може
існувати



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО — одна з найстаріших і перспективних галузей, завдяки якій забезпечується продовольство населення та постачання сировини для ряду інших виробництв.

Кількість і якість сільськогосподарської продукції залежить від:

ВЛАСТИВОСТІ І ОБРОБКИ ҐРУНТУ

КЛІМАТИЧНИХ УМОВ

ЗАХИСТУ РОСЛИН ВІД ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ

ВНЕСЕННЯ ДОБРИВА



ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ

**ЗАЛИШАЄТЬСЯ
ОДИМ З
НАЙВАЖЛИВІШИХ
ФАКТОРІВ
КІЛЬКІСНОГО
І ЯКІСНОГО
ВИРОБНИЦТВА**

Кожного року з'являються нові сорти та гібриди з ще більшим потенціалом врожайності. Усі вони більш вимогливі до умов вирощування і сильно залежать від оптимального забезпечення макро- і мікроелементами. Навколишнє середовище стає все більш негостинним: великі температурні амплітуди, пізні весняні заморозки, холодні дощові періоди після різкої посухи і дуже високі температури.

Всі ці фактори навколишнього середовища вкрай негативно впливають на правильний розвиток рослин. Ми не можемо впливати на атмосферні умови, але можемо безпосередньо впливати на ріст і розвиток вирощуваних нами культур і таким чином справлятися з негативними факторами навколишнього середовища.

ЗАСОБИ, ЯКИМИ МИ КОРИСТУЄМОСЯ - ЦЕ РІДКІ БІОСТИМУЛЯТОРИ

ZINOVII

GRAND

Кожен з наших продуктів є інноваційним, кожен має унікальні якості. Усі вони містять «повний набір» органогенних і функціональних елементів, гумінових і фульвових кислот.





ZINOVII


TRIPLE

Однаково
ефективні при
обробці насіння,
листового
або ґрунтового
застосування

1

ОРГАНОГЕННІ ЕЛЕМЕНТИ

основний будівельний
матеріал, з якого
рослини будують
свій організм



2

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

необхідні для
нормального обміну
речовин в рослинному
організмі



3

ГУМІНОВІ КИСЛОТИ

Гумінові кислоти — це темні макромолекули, які покращують властивості ґрунту. Вони забезпечують виключно хорошу рухливість поживних елементів, наявних у ґрунтового субстраті, і значно посилюють утримання води навколо кореня рослини.

Гумінові кислоти мають хелатуючу дію — вони зв'язуються з мікроелементами і створюють зв'язок, завдяки якому ці елементи краще засвоюються рослинами.

4

ФУЛЬВОВІ КИСЛОТИ

Фульвові кислоти — це молекули з набагато меншою молекулярною масою.

Вони характеризуються швидким і легким проходженням через клітинні мембрани.

Надзвичайно ефективні при листовому застосуванні завдяки швидкій абсорбції.

Мають сильний вплив на процес фотосинтезу.



Вони сприяють набагато більш ефективному поглинанню та розподілу поживних елементів і сильно стимулюють розвиток насіння.

N

АЗОТ

безпосередньо бере участь у процесах росту та розмноження живих організмів, входячи до складу білків.

Недолік азоту викликає серйозні порушення в рослинному організмі. Пригнічується синтез хлорофілу в листі, і вони стають жовто-зеленими. Пожовтіння починається з старих листків, які пізніше опадають. Ріст рослини сповільнюється, а вегетація закінчується передчасно. Урожайність низька.



НЕСТАЧА
АЗОТУ
N

НАШІ ПРОДУКТИ З НАЙВИЩИМ ВМІСТОМ АЗОТУ:



Див. на
СТ. 36



Див. на
СТ. 44



Див. на
СТ. 42



Див. на
СТ. 45



Див. на
СТ. 47



Див. на
СТ. 46

P

ФОСФОР

бере участь у ряді процесів — диханні, фотосинтезі, діленні клітин. Він бере участь як у синтезі, так і в транспортуванні вуглеводів у рослинах. Впливає на кількість і якість одержуваної продукції.

При нестачі фосфору рослини набувають синьо-зеленого кольору з фіолетовим відтінком. Листя дрібні, матові, їх периферія закручується, і утворюються широкі фіолетові плями, а тканини в ураженому місці підсихають і відмирають.



НЕСТАЧА
ФОСФОРУ

P

НАШІ ПРОДУКТИ З НАЙВИЩИМ ВМІСТОМ ФОСФОРУ:



Див. на
СТ. 42



Див. на
СТ. 36



Див. на
СТ. 27

K

КАЛІЙ

має виняткове значення для водного балансу рослини. Добре забезпечені калієм рослини краще долають періоди посухи. Калій підвищує стійкість рослин до холоду та хвороб.

При нестачі калію листя втрачають блиск, між жилками утворюються хлорозні плями. На пізніх стадіях по периферії листка з'являються коричневі плями, і вони передчасно опадають.



НЕСТАЧА
КАЛІЮ
K

НАШІ ПРОДУКТИ З НАЙВИЩИМ ВМІСТОМ КАЛІЮ:



Див. на
СТ. 36



Див. на
СТ. 42



Див. на
СТ. 40



Див. на
СТ. 45



Див. на
СТ. 41



Див. на
СТ. 46

Ca

КАЛЬЦІЙ

це дуже важливий елемент для рослин. Необхідний ще в період проростання насіння. Він безпосередньо впливає на зону росту і має велике значення для нормального розвитку кореневої системи. Також необхідний для розвитку надземних органів.

При нестачі кальцію коріння рослин стають короткими, товщують і мають невелику кількість волосків. На молодих листках затримується зростання, і на них з'являються світло-жовті плями. Пізніше вони опадають. Старі листки залишаються нормальними, але зростання припиняється.

НЕСТАЧА
КАЛЬЦІЮ
Ca

НАШІ ПРОДУКТИ З НАЙВИЩИМ ВМІСТОМ КАЛЬЦІЮ:



Mg

МАГНІЙ

входить до складу молекули хлорофілу в зелених частинах рослини і безпосередньо бере участь у фотосинтезі. При нестачі магнію хлорофіл в зелених частинах рослини зменшується. Листя стають плямистими і в'януть між жилками. На більш пізньому етапі вони повністю жовтіють і опадають.



НЕСТАЧА
МАГНІЮ
Mg

НАШІ ПРОДУКТИ З НАЙВИЩИМ ВМІСТОМ МАГНІЮ:



Див. на
СТ. 36



Див. на
СТ. 41



Див. на
СТ. 42

S

СІРКА

є надзвичайно важливим елементом, оскільки входить до складу білків і вітамінів. При нестачі сірки площа листа та ріст рослини зменшуються. Молоде листя стає світло-зеленим, хлоротичним і майже білим, а старі зберігають свій природний колір. При тривалому голодуванні з'являється антоціанове забарвлення.



НЕСТАЧА
СІРКИ
S

НАШІ ПРОДУКТИ З НАЙВИЩИМ ВМІСТОМ СІРКИ:



Див. на
СТ. 28



Див. на
СТ. 35



Див. на
СТ. 36



Див. на
СТ. 41



Див. на
СТ. 42



Див. на
СТ. 45



Див. на
СТ. 46

Mn

МАРГАНЕЦЬ

пов'язаний з обміном речовин в рослинному організмі і підвищує якість продукції. Нестача марганцю призводить до утворення плямистого хлорозу: на листках між жилками з'являються світло-жовті точкові плями. На більш пізній стадії плями зливаються по довжині листа в довгі безперервні смуги, які поступово підсихають, стають коричневими і з'являються ділянки мертвої тканини.

НЕСТАЧА
МАРГАНЦЮ
Mn



НАШІ ПРОДУКТИ З НАЙВИЩИМ ВМІСТОМ МАРГАНЦЮ:



Див. на
СТ. 43



Див. на
СТ. 41



Див. на
СТ. 35

Cu

МІДЬ

посилює утворення хлорофілу і зменшує його руйнування в листі. Підвищує стійкість рослин до високої та низької температури.

Недолік міді характеризується зблідненням та швидким висиханням верхнього листа. Зернові культури не утворюють колосся або утворюють його неповноцінним.



НЕСТАЧА
МІДІ
Cu

НАШІ ПРОДУКТИ З НАЙВИЩИМ ВМІСТОМ МІДІ:



Див. на
ст. 32



Див. на
ст. 39



Див. на
ст. 43



Див. на
ст. 28



Див. на
ст. 35

Zn

ЦИНК

задіяний у ряді важливих ферментів. Він є необхідним в точках зростання молодого листя, генеративних органах і зародках насіння.

Нестача цинку зупиняє ріст міжвузлів, на листках з'являються світло-зелені тонкі смуги між жилками, які залишаються зеленими, а по краях з'являється пурпурний відтінок.

НЕСТАЧА
ЦИНКУ
Zn



НАШІ ПРОДУКТИ З НАЙВИЩИМ ВМІСТОМ ЦИНКУ:



Див. на
СТ. 39



Див. на
СТ. 28



Див. на
СТ. 42

Mo

МОЛІБДЕН

задіяний в синтезі білків та ферментів. Він є надзвичайно важливим, має велике значення для циклу азоту та його поглинання рослинами.

При дефіциті молібдену з'являється міжжилковий хлороз, листя стають жовтими і закручуються догори на краях листя з'являються некротичні плями.



НЕСТАЧА
МОЛІБДЕНУ

Mo

НАШІ ПРОДУКТИ З НАЙВИЩИМ ВМІСТОМ МОЛІБДЕНУ:



Див. на
СТ. 43



Див. на
СТ. 39



Див. на
СТ. 35



Див. на
СТ. 32



Див. на
СТ. 48

Fe

ЗАЛІЗО

входить до складу ферментів, що беруть участь у низці важливих фізіологічних процесів: диханні, фотосинтезі, синтезі хлорофілу.

При дефіциті заліза спостерігається зміна пігментації листя. Між жилками листя набуває блідо-зеленого кольору, а пізніше — блідо-жовтого забарвлення. Смуги залишаються зеленими з червонуватим відтінком. На краях листя з'являються некротичні плями, які згодом некротизуються і гинуть.



НЕСТАЧА
ЗАЛІЗА
Fe

НАШІ ПРОДУКТИ З НАЙВИЩИМ ВМІСТОМ ЗАЛІЗА:



Див. на
СТ. 42



Див. на
СТ. 41

В

БОР

регулює діяльність багатьох життєво важливих ферментів в організмі рослин. Збільшує кількість цвітоків та зав'язей, є необхідним протягом усієї вегетації.

У разі серйозної нестачі відбувається відмирання конуса росту рослин. Листки стають жовтими, пізніше темніють і некротизуються. У деяких рослин спостерігається перекручування або розщеплення стебла.

НЕСТАЧА
БОРУ
В

НАШІ ПРОДУКТИ З НАЙВИЩИМ ВМІСТОМ БОРУ:



Див. на
СТ. 31



Див. на
СТ. 42



Див. на
СТ. 41



Див. на
СТ. 48

УНІКАЛЬНІСТЬ **НАШИХ
БІОСТИМУЛЯТОРІВ**
ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ РЯД
ПЕРЕВАГ ПОРІВНЯНО З
ІНШИМИ КОНКУРУЮЧИМИ
ПРОДУКТАМИ

УНІКАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРИ



1 **ОБРОБЦІ НАСІННЯ**



2 **ЛИСТОВОМУ ОБПРИСКУВАННІ**



3 **ҐРУНТОВОМУ ЗАСТОСУВАННЮ**





1

ОБРОБКА НАСІННЯ

Обробка насіння нашими продуктами значно збільшує енергію проростання насіння. Молоді рослини вкорінюються набагато краще. Посіви дають рівномірні сходи.

Це найбільш підходящі продукти.

150-200 мл

100 кг
насіння

ДОЗА



необроблені



оброблені



2

ЗАСТОСУВАННЯ ПО ЛИСТУ

Це найпоширеніший спосіб подачі рослині життєво важливих макро- та мікроелементів. Біостимулятори EXTRA FORCE безпосередньо впливають на ріст і розвиток сільськогосподарських культур, покращують фотосинтез, збільшують масу листя та загальну біомасу, стимулюють цвітіння і метаболізм. Вони допомагають рослинам вийти зі стану сильного стресу, викликаного екологічними аномаліями зовнішнього середовища або фітотоксичністю гербіцидів.

Все це призводить до отримання високих врожаїв з відмінною якістю.

1,5-2 літри
гектар

ДОЗА

3

ҐРУНТОВЕ ЗАСТОСОВУВАННЯ

Використовується в овочах в дозуванні 10-30 літрів на гектар у поєднанні з поливами. Макро- та мікроелементи сильно стимулюють ґрунтові мікроорганізми, а коріння і кореневі волоски подовжуються і сильно розгалужуються.

Це найбільш підходящі продукти.



15 літрів
гектар

ДОЗА



20 літрів
гектар

ДОЗА





150-200 ml
100 kg насіння



2 L
гектар



10-30 L
гектар

Зменшити стрес від прямого контакту хімічних речовин пестицидів з рослинами можна за допомогою **«EXTRA FORCE»**. Спочатку приготуйте розчин з пестицидом безпосередньо перед обприскуванням, потім додайте необхідну кількість концентрату **«EXTRA FORCE»**.



Органічний вуглець *	30 %
N*	2,0 %
P ₂ O ₅	0,45 %
K ₂ O	2,0 %
MgO	0,06 %
CaO	0,3 %
Суша речовина	7,0 %
Zn	15 mg/l
Cu	10 mg/l
Mo	8 mg/l
B	10 mg/l
Fe	500 mg/l
Mn	30 mg/l
pH	13

* На основі сухої речовини

* Через природне та органічне походження продукту, значення можуть змінюватися

ПРИ ДЕФІЦИТІ
ЦИНКУ



ZINOVII

Зменшити стрес від прямого контакту хімічних речовин пестицидів з рослинами можна за допомогою **«ZINOVII CORN»**. Спочатку приготуйте розчин з пестицидом безпосередньо перед обприскуванням, потім додайте необхідну кількість концентрату **«ZINOVII CORN»**.



150-200 ml
100 kg насіння



2 L
гектар



10-30 L
гектар

Суша речовина	7,0 %
Органічний вуглець*	8 %
N*	2,0 %
P ₂ O ₅	0,1 %
K ₂ O	3,5 %
MgO	1500 mg/l
CaO	500 mg/l
S	12000 mg/l
Zn	6000 mg/l
Cu	750 mg/l
Mo	1000 mg/l
B	1000 mg/l
Fe	3000 mg/l
Mn	5000 mg/l
pH	13

* На основі сухої речовини

* Через природне та органічне походження продукту, значення можуть змінюватися







ZINOVII



ПРИ ДЕФІЦІТІ
БОРУ



150-200 ml
100 kg насіння



2 L
гектар



10-30 L
гектар

Зменшити стрес від прямого контакту хімічних речовин пестицидів з рослинами можна за допомогою **«ZINOVII Oil +B»**. Спочатку приготуйте розчин з пестицидом безпосередньо перед обприскуванням, потім додайте необхідну кількість концентрату **«ZINOVII Oil +B»**.



Суха речовина	7,0 %
Органічний вуглець*	8 %
N*	2,0 %
P ₂ O ₅	0,1 %
K ₂ O	3,5 %
MgO	1500 mg/l
CaO	500 mg/l
S	6000 mg/l
Zn	5000 mg/l
Cu	750 mg/l
Mo	1000 mg/l
B	7500 mg/l
Fe	3000 mg/l
Mn	5000 mg/l
pH	13

* На основі сухої речовини

* Через природне та органічне походження продукту, значення можуть змінюватися

ПРИ ДЕФІЦИТІ

МОЛІБДЕНУ



ZINOVII

Зменшити стрес від прямого контакту хімічних речовин пестицидів з рослинами можна за допомогою «**ZINOVII double +Mo**». Спочатку приготуйте розчин з пестицидом безпосередньо перед обприскуванням, потім додайте необхідну кількість концентрату «**ZINOVII double +Mo**».



150-200 ml
100 kg насіння



2 L
гектар




10-30 L
гектар

Суша речовина	7,0 %
Органічний вуглець*	8 %
N*	2,0 %
P ₂ O ₅	0,1 %
K ₂ O	3,5 %
MgO	1500 mg/l
CaO	500 mg/l
S	6000 mg/l
Zn	5000 mg/l
Cu	750 mg/l
Mo	7500 mg/l
B	1000 mg/l
Fe	3000 mg/l
Mn	5000 mg/l
pH	13

* На основі сухої речовини

* Через природне та органічне походження продукту, значення можуть змінюватися







ОРГАНІЧНЕ МІНЕРАЛЬНЕ ДОБРИВО
ТА БІОСТИМУЛЯТОР



TRIPLE



OIL

+

B

ZINOVII



ЗМІЦНЮЄ
ЖИВИТЬ
ЗАРЯДЖА

ZINOVII



ПРИ ДЕФІЦІТІ
МАРГАНЦЮ



150-200 ml
100 kg насіння



2 L
гектар



10-30 L
гектар

Зменшіть стрес від прямого контакту хімічних речовин пестицидів з рослинами можна за допомогою **«ZINOVII green +Mn»**. Спочатку приготуйте розчин з пестицидом безпосередньо перед обприскуванням, потім додайте необхідну кількість концентрату **«ZINOVII green +Mn»**.



Суха речовина	7,0 %
Органічний вуглець*	8 %
N*	2,0 %
P ₂ O ₅	0,1 %
K ₂ O	3,5 %
MgO	1500 mg/l
CaO	500 mg/l
S	12000 mg/l
Zn	5000 mg/l
Cu	750 mg/l
Mo	7500 mg/l
B	1000 mg/l
Fe	3000 mg/l
Mn	6000 mg/l
pH	13

* На основі сухої речовини

* Через природне та органічне походження продукту, значення можуть змінюватися

ПРИ
ДЕФІЦІТІ



АЗОТУ



ФОСФОРУ



КАЛІЮ



ZINOVII

Зменшіть стрес від прямого контакту хімічних речовин пестицидів з рослинами можна за допомогою «**ZINOVII Triple NPK**». Спочатку приготуйте розчин з пестицидом безпосередньо перед обприскуванням, потім додайте необхідну кількість концентрату «**ZINOVII Triple NPK**».



150-200 ml
100 kg насіння



2 L
гектар



10-30 L
гектар

Суша речовина	20 %
Органічний вуглець*	5,0 %
N*	6,0 %
P ₂ O ₅	8,0 %
K ₂ O	6,0 %
MgO	5000 mg/l
CaO	200 mg/l
S	8000 mg/l
Zn	2500 mg/l
Cu	500 mg/l
Mo	150 mg/l
B	800 mg/l
Fe	3000 mg/l
Mn	2000 mg/l
pH	8

* На основі сухої речовини

* Через природне та органічне походження продукту, значення можуть змінюватися



ОРГАНІЧНЕ МІНЕРАЛЬНЕ ДОБРИВО
ТА БІОСТИМУЛЯТОР

TRIPLE
+ N P K

ZINOVII

ЗМІЦНЮЄ
ЖИВИТЬ
ЗАРЯДЖА

ZINOVII



150-200 ml
100 kg насіння



2 L
гектар



10-30 L
гектар

Зменшіть стрес від прямого контакту хімічних речовин пестицидів з рослинами можна за допомогою **«ZINOVII Grand»**. Спочатку приготуйте розчин з пестицидом безпосередньо перед обприскуванням, потім додайте необхідну кількість концентрату **«ZINOVII Grand»**.



Суха речовина	7,0 %
Органічний вуглець*	8 %
N*	2,0 %
P ₂ O ₅	0,1 %
K ₂ O	3,5 %
MgO	1500 mg/l
CaO	500 mg/l
S	6000 mg/l
Zn	5000 mg/l
Cu	750 mg/l
Mo	1000 mg/l
B	1000 mg/l
Fe	3000 mg/l
Mn	5000 mg/l
pH	13

* На основі сухої речовини

* Через природне та органічне походження продукту, значення можуть змінюватися



ERMEI

Зменшіть стрес від прямого контакту хімічних речовин пестицидів з рослинами за допомогою «**ERMEI**». Спочатку приготуйте розчин з пестицидом безпосередньо перед обприскуванням, в нього додайте необхідну кількість концентрату «**ERMEI**».



150-200 ml
100 kg насіння



2 L
гектар



10-30 L
гектар

Суха речовина	12,0 %
Органічний вуглець*	6,0 %
N*	0,5 %
P ₂ O ₅	0,06 %
K ₂ O	6,0 %
MgO	1000 mg/l
CaO	1500 mg/l
S	3000 mg/l
Zn	500 mg/l
Cu	100 mg/l
Mo	50 mg/l
B	500 mg/l
Fe	1000 mg/l
Mn	250 mg/l
pH	14

* На основі сухої речовини

* Через природне та органічне походження продукту, значення можуть змінюватися



Alitii



150-200 ml
100 kg насіння



2 L
гектар



10-30 L
гектар

Зменшіть стрес від прямого контакту хімічних речовин пестицидів з рослинами за допомогою «**ALITII**». Спочатку приготуйте розчин з пестицидом безпосередньо перед обприскуванням, в нього додайте необхідну кількість концентрату «**ALITII**».



Суха речовина	16 %
Органічний вуглець*	6,0 %
N*	0,5 %
P ₂ O ₅	0,06 %
K ₂ O	6,0 %
MgO	6000 mg/l
CaO	1500 mg/l
S	8000 mg/l
Zn	5000 mg/l
Cu	750 mg/l
Mo	500 mg/l
B	10000 mg/l
Fe	4000 mg/l
Mn	7500 mg/l
pH	14

* На основі сухої речовини

* Через природне та органічне походження продукту, значення можуть змінюватися

ПРИ
ДЕФІЦІТІ



Зменшіть стрес від прямого контакту хімічних речовин пестицидів з рослинами за допомогою **«GURII»**. Спочатку приготуйте розчин з пестицидом безпосередньо перед обприскуванням, в нього додайте необхідну кількість концентрату **«GURII»**.



gurii



150-200 ml
100 kg насіння



2 L
гектар



10-30 L
гектар

Суха речовина	30 %
Органічний вуглець*	5,0 %
N*	8,0 %
P ₂ O ₅	5,0 %
K ₂ O	9,0 %
MgO	5000 mg/l
CaO	200 mg/l
S	10000 mg/l
Zn	5000 mg/l
Cu	500 mg/l
Mo	500 mg/l
B	10000 mg/l
Fe	4000 mg/l
Mn	800 mg/l
pH	8

* На основі сухої речовини

* Через природне та органічне походження продукту, значення можуть змінюватися



Azarii



150-200 ml
100 kg насіння



2 L
гектар



10-30 L
гектар

Зменшіть стрес від прямого контакту хімічних речовин пестицидів з рослинами за допомогою «Azarii». Спочатку приготуйте розчин з пестицидом безпосередньо перед обприскуванням, в нього додайте необхідну кількість концентрату «Azarii».



Суха речовина *	7 %
Органічний вуглець*	8 %
N*	2,0 %
P ₂ O ₅	0,1 %
K ₂ O	3,5 %
MgO	1500 mg/l
CaO	500 mg/l
S	6000 mg/l
Zn	1000 mg/l
Cu	750 mg/l
Mo	1000 mg/l
B	1000 mg/l
Fe	1000 mg/l
Mn	1000 mg/l
pH	13

* На основі сухої речовини

* Через природне та органічне походження продукту, значення можуть змінюватися



URIEL



150-200 ml
100 kg насіння



2 L
гектар



25-200 L
гектар

Зменшити стрес від прямого контакту хімічних речовин пестицидів з рослинами можна за допомогою **«URIEL»**. Спочатку приготуйте розчин з пестицидом безпосередньо перед обприскуванням, потім додайте необхідну кількість концентрату **«URIEL»**.

Суха речовина	32,50 %
Органічний вуглець*	19,95 %
N*	44,77 %
P ₂ O ₅	0,029 %
K ₂ O	0,185 %
MgO	776 mg/l
CaO	194 mg/l
N-NO ₃	704 mg/l
N-NH ₄	135,13 mg/l
pH	6,74

* На основі сухої речовини

* Через природне та органічне походження продукту, значення можуть змінюватися



AMINO



150-200 ml
100 kg насіння



2 L
гектар



10-30 L
гектар


Зменшити стрес від прямого контакту хімічних речовин пестицидів з рослинами можна за допомогою **«AMINO Gurii»**. Спочатку приготуйте розчин з пестицидом безпосередньо перед обприскуванням, потім додайте необхідну кількість концентрату **«AMINO Gurii»**.



Органічний вуглець*	2,807 +/- 0,014 %
N*	7,17 +/- 0,04 %
P ₂ O ₅	0,2497 +/- 0,011 %
K ₂ O	5,718 +/- 0,032 %
MgO	414 +/- 10 mg/l
CaO	192 +/- 2 mg/l
S	4724 +/- 34 mg/l
Zn	21,36 +/- 0,4 mg/l
Cu	31,6 +/- 0,3 mg/l
Mo	386,9 +/- 1,2 mg/l
B	2122 +/- 27 mg/l
Fe	52,4 +/- 0,3 mg/l
Mn	44,4 +/- 0,2 mg/l
pH	7-8

* На основі сухої речовини

* Через природне та органічне походження продукту, значення можуть змінюватися



AMINO

Зменшити стрес від прямого контакту хімічних речовин пестицидів з рослинами можна за допомогою **«AMINO Triple»**. Спочатку приготуйте розчин з пестицидом безпосередньо перед обприскуванням, потім додайте необхідну кількість концентрату **«AMINO Triple»**.



150-200 ml
100 kg насіння



2 L
гектар



10-30 L
гектар

Органічний вуглець*	1,910 +/- 0,023 %
N*	7,54 +/- 0,04 %
P ₂ O ₅	1,810 +/- 0,018 %
K ₂ O	4,18 +/- 0,25 %
MgO	495/20 mg/l
CaO	219,1 +/- 18,2 mg/l
S	6703 +/- 111 mg/l
Zn	115,1 +/- 1,0 mg/l
Cu	36 +/- 1 mg/l
Mo	388 +/- 6 mg/l
B	2507 +/- 8 mg/l
Fe	63,5 +/- 1,2 mg/l
Mn	205,7 +/- 1,3 mg/l
pH	6-7

* На основі сухої речовини

* Через природне та органічне походження продукту, значення можуть змінюватися



AMINO



150-200 ml
100 kg насіння



2 L
гектар



10-30 L
гектар



НОВ



Зменшити стрес від прямого контакту хімічних речовин пестицидів з рослинами можна за допомогою «**AMINO GOLD**». Спочатку приготуйте розчин з пестицидом безпосередньо перед обприскуванням, потім додайте необхідну кількість концентрату «**AMINO GOLD**».

N*	16,5 %
C	13 %
P ₂ O ₅	0,02 %
K ₂ O	0,2 %
pH	8-9

* На основі сухої речовини

* Через природне та органічне походження продукту, значення можуть змінюватися



sil.a.



150-200 ml
100 kg насіння



2 L
гектар



10-30 L
гектар

Зменшити стрес від прямого контакту хімічних речовин пестицидів з рослинами можна за допомогою «**SILA B+Mo**». Спочатку приготуйте розчин з пестицидом безпосередньо перед обприскуванням, потім додайте необхідну кількість концентрату «**SILA B+Mo**».

N*	1,078 %
C	11,078 %
P ₂ O ₅	1,333 %
K ₂ O	2,21 %
Mo	21 g/l
B	50 g/l
pH	10-11

* На основі сухої речовини

* Через природне та органічне походження продукту, значення можуть змінюватися



сила.



150-200 ml
100 kg насіння



2 L
гектар



10-30 L
гектар

Зменшити стрес від прямого контакту хімічних речовин пестицидів з рослинами можна за допомогою «**SILA MAX**». Спочатку приготуйте розчин з пестицидом безпосередньо перед обприскуванням, потім додайте необхідну кількість концентрату «**SILA MAX**».



Органічний вуглець*	13,06 %
N*	1,042 %
P ₂ O ₅	1,342 %
K ₂ O	2,03 %
MgO	6,9 mg/l
CaO	304 mg/l
S	187 mg/l
Zn	39 mg/l
Cu	50 mg/l
Mo	150 mg/l
B	300 mg/l
Fe	4,6 mg/l
Mn	2,2 mg/l
pH	10-11

* На основі сухої речовини

* Через природне та органічне походження продукту, значення можуть змінюватися

	ZINOVII TRIPLE	ZINOVII TRIPLE NPK	ZINOVII TRIPLE CORN+Zn	ZINOVII TRIPLE OIL+B	ZINOVII TRIPLE GREEN+Mn	ZINOVII TRIPLE DOUBLE+Mo	ZINOVII GRAND	ZINOVII GRAND gurii	ZINOVII GRAND Azoni	ZINOVII GRAND Alitii	ZINOVII GRAND ERMEI	URIEL	AMINO Gurii	AMINO Triple	AMINO GOLD	SILA B+Mo	SILA MAX
Суша речовина	7,0 %	20 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	30,0 %	7,0 %	16,0 %	12,0 %	32,5 %	-	-	-	-	-
Органічний вуглець*	30 %	5,0 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %	5,0 %	8 %	6,0 %	6,0 %	19,95 %	2,807 %	1,910 %	13 %	11,078 %	13,06 %
N*	2,0 %	6,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	8,0 %	2,0 %	0,5 %	0,5 %	NO, 704 mg/l NH, 135,13 mg/l	7,17 %	7,54 %	16,5 %	1,078 %	1,042 %
P ₂ O ₅	0,45 %	8,0 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	5,0 %	0,1 %	0,06 %	0,06 %	0,029 %	0,2497 %	1,810 %	0,02 %	1,333 %	1,342 %
K ₂ O	2,0 %	6,0 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	9,0 %	3,5 %	6,0 %	6,0 %	0,185 %	5,718 %	4,18 %	0,2 %	2,21 %	2,03 %
MgO	0,06 %	5000 mg/l	1500 mg/l	1500 mg/l	1500 mg/l	1500 mg/l	1500 mg/l	5000 mg/l	1500 mg/l	6000 mg/l	1000 mg/l	776 ml/l	414 ml/l	495 ml/l	-	-	6,9 mg/l
CaO	0,03 %	200 mg/l	500 mg/l	500 mg/l	500 mg/l	500 mg/l	500 mg/l	200 mg/l	500 mg/l	1500 mg/l	1500 mg/l	194 ml/l	192 ml/l	219,1 ml/l	-	-	304 mg/l
S	-	8000 mg/l	12000 mg/l	6000 mg/l	12000 mg/l	6000 mg/l	6000 mg/l	10000 mg/l	6000 mg/l	8000 mg/l	3000 mg/l	-	4724 ml/l	6703 ml/l	-	-	187 mg/l
Zn	15 mg/l	2500 mg/l	6000 mg/l	5000 mg/l	5000 mg/l	5000 mg/l	5000 mg/l	5000 mg/l	1000 mg/l	5000 mg/l	500 mg/l	-	21,36 ml/l	115,1 ml/l	-	-	39 mg/l
Cu	10 mg/l	500 mg/l	750 mg/l	750 mg/l	750 mg/l	750 mg/l	750 mg/l	500 mg/l	750 mg/l	500 mg/l	100 mg/l	-	31,6 ml/l	36,0 ml/l	-	-	50 mg/l
Mo	8 mg/l	150 mg/l	1000 mg/l	1000 mg/l	7500 mg/l	7500 mg/l	1000 mg/l	500 mg/l	1000 mg/l	500 mg/l	50 mg/l	-	386,9 ml/l	388,0 ml/l	-	21 g/l	150 mg/l
B	10 mg/l	800 mg/l	1000 mg/l	7500 mg/l	1000 mg/l	1000 mg/l	1000 mg/l	10000 mg/l	1000 mg/l	10000 mg/l	500 mg/l	-	2122 ml/l	2507 ml/l	-	50 g/l	300 mg/l
Fe	500 mg/l	3000 mg/l	3000 mg/l	3000 mg/l	3000 mg/l	3000 mg/l	3000 mg/l	4000 mg/l	1000 mg/l	4000 mg/l	1000 mg/l	-	52,4 ml/l	63,5 ml/l	-	-	4,6 mg/l
Mn	30 mg/l	2000 mg/l	5000 mg/l	5000 mg/l	6000 mg/l	5000 mg/l	5000 mg/l	800 mg/l	1000 mg/l	7500 mg/l	250 mg/l	-	44,4 ml/l	205,7 ml/l	-	-	2,2 mg/l
pH	13,0	8,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	8,0	13,0	14,0	14,0	6,74	7-8	6-7	8-9	10-11	10-11

КУЛЬТУРА	ОБРОБКА	ДОЗА
Пшениця, ячмінь, овес	Фаза 1: закінчення кущення і початок трубкування. Фаза 2: Початок виходу колоса	2 літри/гектар
	Насіння	100-200 мл/100 кг насіння
Кукурудза	Фаза: 5 -8 лист і фаза: перед початком виходу волоті	2 літри/гектар
	Насіння	100-200 мл/100 кг насіння
Соняшник	Фаза: 5-10 лист і фаза: вид зірочки	2 літри/гектар
	Насіння	100-200 мл/100 кг насіння
Ріпак	Фаза: 2-3 лист	2 літри/гектар
	Фаза: формування стебла	2 літри/гектар
	Фаза: вид «розетки»	2 літри/гектар
	Насіння	100-200 мл/100 кг насіння
Соя	Обробляється двічі, на початку цвітіння та перед зав'яззю бобів	2 літри/гектар
	Насіння	100-200 мл/100 кг насіння
Горох	Обробляється двічі, на початку цвітіння та перед зав'яззю бобів	2 літри/гектар
	Насіння	100-200 мл/100 кг насіння
Всі інші бобові культури	Обробляється двічі, на початку цвітіння та перед зав'яззю бобів	2 літри/гектар
	Насіння	100-200 мл/100 кг насіння

Фруктові культури (яблука, перики, абрикоси, сливи)	Два-три рази після цвітіння через 30-денний інтервал	2 літри/гектар
	Насіння	100-200 мл/100 кг насіння
Виноградники (винні, десертні)	Дворазовий при довжині лози 10 см і утворення ягоди	2 літри/гектар
	Насіння	100-200 мл/100 кг насіння
Овочеві культури (помідори, огірки, перець, баклажани, кабачки)	Обробляється протягом усього вегетаційного періоду з інтервалом 7-14 днів	1,5 літр/гектар
	Насіння	100-200 мл/100 кг насіння
Цибуля, часник, цибуля- порей, морква, редис, капуста, брокколі, картопля, карфіол, листові овочі	Обробляється двічі протягом вегетації	1,5 літри/гектар
	Насіння	100-200 мл/100 кг насіння
Гарбузи	Триразова обробка в період вегетації, 3-5-листова фаза, перед цвітінням, перед формуванням плодів	2 літри/гектар
	Насіння	100-200 мл/100 кг насіння
Кавуни і дині	Обробляється двічі протягом вегетації, до цвітіння і дозрівання плодів	2 літри/гектар
	Насіння	100-200 мл/100 кг насіння
Полуниця, малина, ожина, смородина	Після цвітіння з інтервалом 1-20 днів	1,5 літр/гектар
	Насіння	100-200 мл/100 кг насіння
Люцерна, пасовища, газони	Після виходу з спокою і через 10-15 днів після кожного поко- са (при формуванні біомаси)	2 літри/гектар
	Насіння	100-200 мл/100 кг насіння
Буряк	Триразове внесення в фази 4-6, 6-8 і 8-10 листка	2 літри/гектар
	Насіння	100-200 мл/100 кг насіння
Тютюн	Після пересадки дві обробки з інтервалом в 20 днів	2 літри/гектар
	Насіння	100-200 мл/100 кг насіння





ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА
ЗАДЛЯ ОТРИМАННЯ ДЕТАЛЬНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОДУКЦІЮ

+38 (066) 121 31 11

агроном-консультант

+38 (068) 121 31 11

прийом замовлень

+38 (093) 121 31 11

менеджер з продажу

+38 (097) 121 31 11

менеджер з продажу

agropesticid.com
agropesticidmlt@gmail.com

ТОВ «АГРО-ПЕСТИЦИД»

КОД ЄДРПОУ: 44485232, ІПН: 444852308320
ЮРИДИЧНА АДРЕСА: ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ,
МІСТО ПОЛТАВА, ВУЛ. СОБОРНОСТІ, 40
ТЕЛЕФОН: +38 (067) 613 31 81
ДИРЕКТОР: МАКАРОВ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

